


  
**Triacana® A.P.****TIRATRICOL****CAPSULAS**

**FORMULA:** Cada cápsula contiene: Acido 3,5,3'-Triiodotiroacético (TA3) 2 mg. Excipientes: Metilcelulosa, Lactosa granulada, Povidona, Talco, Estearato de Magnesio, c.s.

**ACCION TERAPEUTICA:** Aumenta el metabolismo de los lípidos al inhibir la fosfodiesterasa del adipocito. Su efecto calorigénico resulta que 1 mg de TRIAC (3, 5, 3' -triiodotiroacético) equivale a un 17 % de la dosis usual de 50 ug de 3, 5, 3' - triiodotironina (T3) y es el 17 % de 200 ug de Levotiroxina y liotironina simil.

**POSOLOGIA:** 1 cápsula por día.

**ACCIONES COLATERALES Y SECUNDARIAS:** Se ha señalado especialmente en sujetos ansiosos y neurotóxicos: palpitaciones, taquicardia, temblores, que ceden con la reducción de la posología y solo excepcionalmente obligan a discontinuar el tratamiento. No se ha observado ningún caso de repercusión sobre la función tiroidea, cualquiera fuese la duración del tratamiento.



**REACCIONES ADVERSAS:** La sobredosificación puede producir: cefalea, diarrea, nerviosismo, irregularidad menstrual, insomnio, fiebre. Si aparecen estas sintomatologías, suspender la medicación 72 horas y restituir el tratamiento con dosis menores.

**PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS:** Vigilar regularmente los niveles glucémicos de los diabéticos.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:** La aplicación de epinefrina inyectable en pacientes con enfermedad coronaria puede provocar angor. Puede potenciar el efecto de los anticoagulantes cumarínicos, en tal caso reducir la dosis a un tercio. Cuando la dosis de TRIAC es elevada, los pacientes diabéticos pueden requerir dosis mayores de insulina o hipoglucemiantes orales.

**ANTAGONISMOS, ANTIDOTISMOS:** Los mismos de las hormonas tiroideas (Tiouracilo, mercaptoimidazol).

**CONTRAINDICACIONES:** Embarazo, tirotoxicosis, hipertensión arterial, afecciones coronarias evolutivas, infartos de miocardio, hipertiroidismo, intolerancia al yodo.

**PRESENTACION:** Envase de 30 cápsulas.

**CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO: CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 15°C Y 30°C.**

**"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACION CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGIA:**  
**HOSPITAL DE PEDIATRIA RICARDO GUTIERREZ: (011) 4962-6666/2247**  
**HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648/4658-7777**

**SIDUS S.A.**

Adm.: Av. Dardo Rocha 944, Martínez, Provincia de Buenos Aires.

Lab.: Ruta 8 Km. 60, Calle 12 N° 985, Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Director Técnico: Nestor J. Tessore, Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 36.809

Industria Argentina - Venta bajo receta.