

  
**Cardiax®**

ACIDO ACETILSALICILICO  
VITAMINA C



## COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

### FORMULA:

Cada comprimido recubierto contiene: Acido Acetilsalicílico 125 mg, Vitamina C recubierta 125 mg, Almidón de maíz pregelatinizado, Dióxido de silicio coloidal, Vitamina E, Celulosa microcristalina, Talco, Opadry CLEAR, Acryl Eze WHITE, Opadry RED, Simeticona, Trietilcitrato, Rojo Punzó Laca Aluminica. c.s.

### ACCION TERAPEUTICA:

Antiagregante plaquetario, antioxidante.

### INDICACIONES:

Profilaxis de trombosis. Se ha demostrado una acción del Acido Acetilsalicílico en la profilaxis del tromboembolismo en pacientes con enfermedad trombotica vascular: angina de pecho, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular transitorio o isquémico, trombosis venosas superficiales y profundas, antecedentes de by pass, prótesis vasculares.

### ACCION FARMACOLOGICA:

El Acido Acetilsalicílico es un fármaco analgésico, antiinflamatorio y además previene la adherencia plaquetaria generadora de trombos, reduciendo así, la posibilidad de aparición de infarto de miocardio y accidentes cardiovasculares, ya que inhibe la actividad de la enzima ciclooxigenasa; la cual interviene en la síntesis de tromboxano A2. Por su propiedad antioxidante la vitamina C actúa contra la producción de radicales libres que están íntimamente relacionados a la formación y persistencia de la placa de aterosclerosis.

### FARMACOCINETICA:

El Acido Acetilsalicílico se absorbe casi por completo a nivel intestinal, posee una alta unión a proteínas plasmáticas. Se metaboliza a nivel hepático y parte se elimina como droga activa a nivel renal. La alcalinización de la orina aumenta

el porcentaje de eliminación de la droga que se elimina por vía renal. El Acido Acetilsalicílico sigue una cinética dosis-dependiente, al aumentar la dosis de la droga se acumula en el organismo y se alarga la vida media de eliminación del ácido salicílico. La vitamina C se absorbe rápidamente y completamente en el tracto gastrointestinal. Una vez absorbida pasa a la sangre. Se almacena en todos los órganos. Se excreta especialmente por orina.

### POSOLOGIA:

Salvo otra indicación médica, se sugiere en adultos, tomar 1 a 2 comprimidos recubiertos por día. En caso de tomar 1 comprimido recubierto, se aconseja hacerlo por la noche al acostarse.

### MODO DE ADMINISTRACION:

Los comprimidos recubiertos de CARDIAX® deberán ingerirse con agua o jugos.

### CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a el Acido Acetilsalicílico u otros salicilatos como a algún otro componente de la formulación. Úlcera gástrica o duodenal. Hipoprotrombinemia y hemofilia.

### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Deberá usarse con precaución en pacientes con historia de úlcera gastrointestinal, anomalías en la coagulación, alergia a los antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Se deberá utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal y/o hepática.

### Embarazo:

Durante el primer trimestre de embarazo, se deberá usar con precaución, ya que el Acido Acetilsalicílico y los salicilatos pueden producir trastornos en la coagulación de la sangre materna fetal como así también prolongar el trabajo de parto. Los salicilatos desplazan de su ligadura proteica a las sulfonilureas (hipoglucemiantes orales) y anticoagulantes orales (derivados cumarínicos, Heparina), pudiendo potenciar el efecto de los mismos. Los salicilatos inhiben el efecto uricosúrico del Probenecid y retardan la eliminación de las penicilinas y Metotrexato (competencia en el transporte de ácidos en el riñón).

### REACCIONES ADVERSAS:

Hipersensibilidad, náuseas, vómitos, epigastralgia, pirosis,





pérdida de sangre oculta en la materia fecal (CARDIAX® por su capa entérica reduce la irritación gástrica). Hemorragias gastrointestinales, anemia, tinnitus, neutropenia, agranulocitosis.

**PRESENTACION:**

Envase conteniendo 30 comprimidos recubiertos.

**SOBREDOSIFICACION:**

**ANTE LA EVENTUALIDAD DE SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRA AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNÍQUESE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:**

**EN ARGENTINA:**

**HOSPITAL GUTIERREZ: (011) 4962-6666 / 2247.**

**HOSPITAL POSADAS: (011) 4654-6648 / 7777.**

**HOSPITAL FERNANDEZ: (011) 4801-5555 / 7767.**

**EN PARAGUAY:**

**HOSPITAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS.**

**AVDA. GENERAL SANTOS E/ TEODORO S. MONGELÓS.**



**TEL.: 203 113.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
CONSERVAR AL ABRIGO DE LA LUZ Y A TEMPERATURA INFERIOR A 30°C.**

**SIDUS S.A.**

Adm.: Av. Dardo Rocha 944, Martínez, Pcia. de Bs. As.

Lab.: Ruta 8, Km. 60, Calle 12 N° 985, Pilar, Pcia. de Bs. As.

Dir. Téc.: Néstor J. Tessore, Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Cert. N°: 44.565.

N° de Registro en Paraguay: 07049-03-EF.

Rep.: **SIDUS S.A.**, Capitán P. Oviedo 177, Asunción.

Tel.: 614 312.

Regente: Alejandro Siemazko. Reg. N°: 2948.

Industria Argentina - Venta bajo receta



152.792 0315