Lubrol®

SIDUS

CARBOXIMETILCELULOSA SODICA
GLICERINA

SIN PRESERVANTE S.O.C. SIN PRESERVANTE

SOLUCION OFTALMICA ESTERIL

Industria Argentina
Venta bajo receta

FORMULA:
Cada 100 ml de solución oftálmica contiene:
Carboximetilcelulosa Sódica 0,500 g. Glicerina 0,900 g. Excipientes: L-Carnitina, Complejo estabilizado de Oxicloro (SOC), Polisorbato 80, Cloruro de Potasio, Fosfato Monobásico de Sodio Monohidrato, Fosfato Dibásico de Sodio Anhidro, Agua para inyección CSP.

ACCION TERAPEUTICA:
Lubricante y humectante ocular.

INDICACIONES TERAPEUTICAS
LUBROL® está indicada para mejorar la sequedad de los ojos, la falta de lagrimeo e irritación ocular.

FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA
LUBROL® es una solución oftalmológica estéril de doble acción, lubricante e hidratante de la superficie ocular. Las sustancias contenidas en la solución de **LUBROL®** le confieren características de una solución muy próxima de la lágrima natural, suplementándola cuando ésta se encuentra en una cantidad reducida e imitando su actividad.
Farmacocinética: La solución no presenta una actividad farmacológica, actuando únicamente de modo mecánico y no sufre absorción después de aplicada sobre la superficie ocular. La solución se mezcla con la película de la lágrima, produciendo en ella alteraciones significativas y facilitando su dispersión sobre la superficie ocular.
Farmacodinámica: La glicerina es un agente emoliente que actúa sobre la tonicidad de la película, que al combinar con la carboximetilcelulosa, la película lagrimal del usuario proporciona una mejora inmediata a los síntomas de sequedad ocular (irritación, ardor e incomodidad), o que pueden ser causados por la exposición al viento, sol, calor y al aire seco.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION
Solución exclusivamente de uso oftálmico.
Instilar una o dos gotas en uno o ambos ojos afectados tantas veces como sea necesario.
Siga las indicaciones de su médico, respetando siempre los horarios, dosis y duración del tratamiento.

CONTRAINDICACIONES
Está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida a los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES GENERALES
Para evitar la contaminación de la solución, no apoyar la punta del frasco en los ojos, dedos y en ninguna otra superficie. Si la solución cambia de coloración no debe ser utilizada.
El uso de lentes de contacto en general no es recomendado en personas que presentan ojos secos; sin embargo, si el uso de los lentes estuviere indicado, los lentes de contacto deben ser retirados antes de la aplicación de **LUBROL®** y recolocados 15 minutos después de su administración.
En caso de dolor ocular, alteraciones de la visión, irritación y ojos rojos persistentes o si los síntomas se agravan o persisten por más de 72 horas, discontinúe el uso del producto y consulte a su médico.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
No hay evidencias al respecto hasta el momento.
Se deberá evaluar la relación riesgo-beneficio.

EFECTOS ADVERSOS
LUBROL® es generalmente bien tolerado, pudiendo causar un nublado temporal de la visión después de la instilación, debido a su viscosidad.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GENERO
No hay evidencias al respecto, hasta el momento.

ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO
No hay evidencias al respecto, hasta el momento.

PRECAUCIONES en relación con efectos de carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad.
No hay evidencias al respecto, hasta el momento.

SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACION, CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGIA:
HOSPITAL DE PEDIATRIA RICARDO GUTIERREZ:
(011) 4962-6666/2247.
HOSPITAL A. POSADAS:
(011) 4654-6648 / 4658-7777

PRESENTACION: Frasco conteniendo 15 ml.

CONSERVAR A TEMPERATURAS ENTRE 15 Y 30°C. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

SIDUS S.A.
Administración: Av. Dardo Rocha 944, Martínez, Pcia. de Bs. As.
Laboratorio: Ruta 8, Km. 60, Calle 12 N° 985, Pilar, Pcia. de Bs.As.
Director Técnico: Néstor J. Tessore, Farmacéutico.
Esp. Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 55811

153.375 0218